Erkennen &
Bestimmen

60 Fischarten
der Donau

**JOINT
DANUBE
SURVEY 4**

ENTDECKE UNSERE DONAUFISCHE

DIE FISCHER DER DONAU

LERNE DIE FISCHER DER DONAU KENNEN!

Die über 70 Fischarten der Donau sind hervorragend an die verschiedensten Wasserlebensräume angepasst. Einige Arten leben in Bodennähe, andere zwischen Wasserpflanzen am Ufer, manche sind gute Schwimmer, andere bevorzugen langsam fließende Bereiche. Die Fischarten sind unterschiedlich groß – von wenigen Zentimetern bei den Grundeln bis zu drei Metern beim Wels bzw. bis zu acht Metern bei den Stören. Auch die Nahrungsquellen sind unterschiedlich und umfassen Plankton, Pflanzen, kleine Tiere und andere Fische.

Einige Arten wandern oft hunderte Kilometer, um die für sie wichtigen Flussabschnitte, wie beispielsweise zur Eiablage, zu erreichen. Die folgenden Karten bieten Informationen über die Charaktereigenschaften und die Körperform der wichtigsten Donaufische. Viele dieser Arten sind durch Verschmutzung und zu intensive Nutzung unserer Gewässer stark bedroht – diese Information ist auch auf den jeweiligen Karten ersichtlich.

Fische sind ideale Indikatoren für den ökologischen Zustand eines Gewässers. In der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind Fische eines von fünf biologischen Qualitätselementen zur Bestimmung des ökologischen Zustands - neben wirbellosen Tieren, Wasserpflanzen, Algen und Plankton.

Wir wünschen Euch mit den Fischkarten viel Spaß beim Erforschen unserer Fische der Donau!

**JOINT
DANUBE
SURVEY 4**

danubesurvey.org/jds4

**DER JDS4 WAR DIE UMFANGREICHSTE FLUSS-
UNTERSUCHUNG WELTWEIT IM JAHR 2019.**

Die IKSD übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für den gesamten Inhalt.
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht.

Zum vierten Mal (im Abstand von jeweils 6 Jahren) wird diese Studie durchgeführt und hat den Zweck, umfassende Informationen über den Zustand der 2,857km langen Donau und ihrer Hauptzubringer zu sammeln. Das Einzugsgebiet der Donau erstreckt sich über 10% von Europa auf 19 Staaten - das macht die Donau zum internationalsten Fluss der Welt!

Die Ergebnisse werden uns einen genauen Überblick über die Lebewelt der Donau geben, auch über die vielfältigen Fische. Zusätzlich soll auch mehr öffentliches Bewusstsein für Wasserschutzthemen im gesamten Donaueinzugsgebiet geschaffen werden.

BESCHREIBUNG DER FAMILIEN

WWW.DANUBESURVEY.ORG

Auf den nächsten Karten werden die Fischfamilien der Donau kurz vorgestellt. Eine Erklärung der Fachbegriffe und weiterführende Informationen findest du auf der JDS4 Webseite.

AALE (ANGUILLIDAE)

sind ursprünglich nicht heimisch in der Donau - sie wurden ausgesetzt. Aale ziehen zum Laichen vom Süßwasser ins Meer.

MERKMALE schlangenförmige Gestalt, Rücken-, Schwanz- und Afterflosse sind zu einem durchgehenden Flossensaum zusammengewachsen, keine Bauchflossen, die Brustflossen sind gut entwickelt, je Seite eine Kiemenöffnung, zwei Nasenöffnungen

Aal *Anguilla anguilla*

Art **Anguilla anguilla** **AAL**
Name Engl. **Eel**

Max. Länge
150 cm

Familie
Aale (Anguillidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
vom Aussterben bedroht

bevorzugte Nahrung
keine Präferenzen

Querschnitt
rund

Laichzeit
laicht nur im Meer

Laichsubstrat
Freiwasser

Wanderdistanz
lang

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering-mittel

BACHSCHMERLEN (NEMACHEILIDAE)

leben versteckt in langsam bis mäßig schnell fließenden Gewässerbereichen

MERKMALE zwei Bartelpaare am Oberkiefer, ein Bartelpaar am Unterkiefer, Schwimmblase zurückgebildet

Bachschmerle *Barbatula barbatula*

Art **Barbatula barbatula**
Name Engl. **Stone loach**

BACHSCHMERLE

Max. Länge
15 cm

Familie
Bachschmerlen (Nemacheilidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
April–Juni

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

BARSCHE (PERCIDAE)

leben vorwiegend räuberisch, große Arten ernähren sich von anderen Fischen.

MERKMALE zwei Rückenflossen, erste Rückenflosse aus Stacheln, Afterflosse mit 1-2 Stacheln, Kammschuppen

Donaukaulbarsch *Gymnocephalus baloni*
Flussbarsch *Perca fluviatilis*
Kaulbarsch *Gymnocephalus cernua*
Schrätzer *Gymnocephalus schraetser*
Streber Zingel streber
Wolgazander *Sander volgensis*
Zander *Sander lucioperca*
Zingel *Zingel zingel*

Art **Gymnocephalus baloni**
Name Engl. **Danube ruffe**

DONAUKAULBARSCH

Max. Länge
18 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval

Laichzeit
April–Juni

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art *Perca fluviatilis*
Name Engl. Perch

FLUSSBARSCH

Max. Länge
50 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen,
Fische**

Querschnitt
oval

Laichzeit
April–Juni

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Gymnocephalus cernua**
Name Engl. **Ruffe**

KAULBARSCH

Max. Länge
18 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
März–Mai

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Gymnocephalus schraetser**
Name Engl. **Schraetser**

SCHRÄTZER

Max. Länge
20 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Zingel streber**
Name Engl. **Streber**

STREBER

Max. Länge
20 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
stark

Art **Sander volgensis**
Name Engl. **Volga pikeperch**

WOLGAZANDER

Max. Länge
60 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Fische

Laichzeit
April–Mai

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Sander lucioperca**
Name Engl. **Pikeperch**

ZANDER

Max. Länge
120 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Fische

Querschnitt
oval

Laichzeit
März–Mai

Laichsubstrat
Nest in Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Zingel zingel**
Name Engl. **Zingel** **ZINGEL**

Max. Länge
50 cm

Familie
Barsche (Percidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

HECHTE (ESOCIDAE)

sind effiziente Jäger, die auf kleinere Beutefische lauern.

MERKMALE After- und Rückenflosse weit hinten am Körper, entenschnabelförmiges Maul

Hecht *Esox lucius*

Art **Esox lucius**
Name Engl. **Pike**

HECHT

Max. Länge
140 cm

Familie
Hechte (Esocidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Fische

Querschnitt
rund

Laichzeit
Februar–Juni

Laichsubstrat
Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

HUNDSFISCHE (UMBRIDAE)

leben in pflanzenreichen und flachen Gewässern mit schlammigem Grund und sind vom Aussterben bedroht.

MERKMALE keine Barteln, lange Rückenflosse, Kiemendeckel und Wangen beschuppt, Kiefer bezahnt, länglicher Körper

Art **Umbra krameri**
Name Engl. **European mud-minnow**

HUNDSFISCH

Max. Länge
10 cm

Familie
Hundsfische (Umbridae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
gefährdet

bevorzugte Nahrung
Kleinlebewesen

Laichzeit
März–April

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval

Laichsubstrat
Pflanzen

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

KARPFENFISCHE (CYPRINIDAE)

sind die artenreichste heimische Familie mit sehr vielen Arten von sehr klein bis sehr groß, darunter der Karpfen als einer der beliebtesten Speisefische.

MERKMALE keine Zähne im Maul, der fünfte Kiemenbogen ist zu Schlundzähnen umgebildet, Rundschuppen, keine oder ein bis zwei Paar Barteln

Aitel Squalius cephalus
Barbe Barbus barbus
Bitterling Rhodeus amarus
Brachse Abramis brama
Elritze Phoxinus phoxinus
Frauennerfling Rutilus pigus
Giebel Carassius gibelio
Gründling Gobio gobio
Güster Blicca bjoerkna
Hasel Leuciscus leuciscus
Karausche Carassius carassius
Karpfen Cyprinus carpio
Kesslergründling Romanogobio kesslerii
Laube Alburnus alburnus
Moderlieschen Leucaspilus delineatus
Nase Chondrostoma nasus
Nerfling Leuciscus idus
Rotauge Rutilus rutilus
Rotfeder Scardinius erythrophthalmus
Rußnase Vimba vimba
Schied Aspius aspius
Schleie Tinca tinca
Schneider Alburnoides bipunctatus
Sichling Pelecus cultratus
Steingressling Romanogobio uranoscopus
Strömer Telestes souffia
Weißflossengründling Romanogobio vladykovi
Zobel Ballerus sapa
Zope Ballerus ballerus

Art **Squalius cephalus** **AITEL**
Name Engl. **Chub**

Max. Länge
60 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
keine Präferenzen

Querschnitt
rund

Laichzeit
April-Juni

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Barbus barbus**
Name Engl. **Barbel**

BARBE

Max. Länge
100 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art **Rhodeus amarus**
Name Engl. **Bitterling**

BITTERLING

Max. Länge
10 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
in Muscheln

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Abramis brama**
Name Engl. **Bream**

BRACHSE

Max. Länge
70 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
Mai-Juni

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval hoch

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering-mittel

Art **Phoxinus phoxinus**
Name Engl. **Eurasian minnow**

ELRITZE

Max. Länge
10 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval

Laichzeit
Mai-Juli

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art *Rutilus pigus*
Name Engl. Danube roach

FRAUENNERFLING

Max. Länge
60 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
März–Mai

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval hoch

Laichsubstrat
Schotter / Kies

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art **Carassius gibelio**
Name Engl. **Prussian carp**

GIEBEL

Max. Länge
40 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
Mai-Juli

Laichsubstrat
Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Gobio gobio**
Name Engl. **Gudgeon**

GRÜNDLING

Max. Länge
20 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Blicca bjoerkna**
Name Engl. **White bream**

GÜSTER

Max. Länge
30 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Leuciscus leuciscus**
Name Engl. **Dace**

HASEL

Max. Länge
30 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Kleinlebewesen

Laichzeit
März–April

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Carassius carassius**
Name Engl. **Crucian carp**

KARAUSCHE

Max. Länge
40 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
März–Juni

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval hoch

Laichsubstrat
Pflanzen

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Cyprinus carpio**
Name Engl. **Carp**

KARPFEN

Max. Länge
100 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
Mai-Juni

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval hoch

Laichsubstrat
Pflanzen

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Romanogobio kesslerii**
Name Engl. **Kessler's gudgeon**

KESSLERGRÜNDLING

Max. Länge
15 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art **Alburnus alburnus**
Name Engl. **Bleak**

LAUBE

Max. Länge
20 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Kleinlebewesen

Laichzeit
Mai-Juni

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering-mittel

Art **Leucaspius delineatus**
Name Engl. **Sunbleak**

MODERLIESCHEN

Max. Länge
10 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Plankton

Querschnitt
oval

Laichzeit
April–Juli

Laichsubstrat
Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Chondrostoma nasus**
Name Engl. **Nase**

NASE

Max. Länge
60 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Pflanzen

Querschnitt
oval

Laichzeit
März–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art **Leuciscus idus**
Name Engl. **Ide**

NERFLING

Max. Länge
50 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Kleinlebewesen

Laichzeit
März–Mai

Wanderdistanz
mittel

Querschnitt
oval

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Rutilus rutilus**
Name Engl. **Roach**

ROTAUGE

Max. Länge
40 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
Pflanzen / Schotter

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Scardinius erythrophthalmus**
Name Engl. **Rudd**

ROTFEDER

Max. Länge
40 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Pflanzen und
Insekten**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
April–Mai

Laichsubstrat
Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Vimba vimba**
Name Engl. **Vimba bream**

RUSSNASE

Max. Länge
50 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art **Aspius aspius**
Name Engl. **Asp**

SCHIED

Max. Länge
100 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Fische

Querschnitt
oval

Laichzeit
März–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art *Tinca tinca*
Name Engl. Tench

SCHLEIE

Max. Länge
60 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
Juni–August

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval

Laichsubstrat
Pflanzen

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Alburnoides bipunctatus**
Name Engl. **Spirlin**

SCHNEIDER

Max. Länge
20 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Insekten

Querschnitt
oval

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering-mittel

Art **Pelecus cultratus**
Name Engl. **Sabre carp**

SICHLING

Max. Länge
50 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Plankton

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
April-Juni

Laichsubstrat
Freiwasser

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Romanogobio uranoscopus**
Name Engl. **Danubian gudgeon**

STEINGRESSLING

Max. Länge
15 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art **Telestes souffia**
Name Engl. **Blageon**

STRÖMER

Max. Länge
20 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
März–Mai

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

Art **Romanogobio vladykovi**
Engl. **White-finned gudgeon**

WEISSFLOSSENGRÜNDLING

Max. Länge
15 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Ballerus sapa**
Name Engl. **Danube bream**

ZOBEL

Max. Länge
40 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Ballerus ballerus**
Name Engl. **Blue bream**

ZOPE

Max. Länge
40 cm

Familie
Karpfenfische (Cyprinidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Plankton

Laichzeit
Mai-Juni

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
oval hoch

Laichsubstrat
Schotter / Kies

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

sind schlechte Schwimmer,
die Bodentiere fressen und am
Gewässergrund leben.

MERKMALE 2 Rückenflossen, erste
Rückenflosse aus Hartstrahlen,
Bauchflossen getrennt, großes Maul,
keine Schuppen, keine Schwimmblase

Koppe Cottus gobio

Art **Cottus gobio**
Name Engl. **Bullhead**

KOPPE

Max. Länge
15 cm

Familie
Koppen (Cottidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
März–Mai

Laichsubstrat
bewacht in Höhlen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

LACHSFISCHE (SALMONIDAE)

bevorzugen kühle, sauerstoffreiche Gewässer, ernähren sich von Insekten und anderen Fischen, laichen im Süßwasser über kiesigem oder steinigem Grund.

MERKMALE Fettflosse vorhanden, keine Barteln, zur Laichzeit bildet sich bei Milchneben ein Laichhaken aus

Bachforelle Salmo trutta fario
Huchen Hucho hucho

Art **Salmo trutta fario**
Name Engl. **Brown trout**

BACHFORELLE

Max. Länge
70 cm

Familie
Lachsfische (Salmonidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
Oktober–Dezember

Laichsubstrat
im Kies vergraben

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
stark

Art **Hucho hucho**
Name Engl. **Danube salmon**

HUCHEN

Max. Länge
150 cm

Familie
Lachsfische (Salmonidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
stark gefährdet

bevorzugte Nahrung
Fische

Querschnitt
rund

Laichzeit
März–Mai

Laichsubstrat
im Kies vergraben

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
mittel - stark

A stylized, yellow silhouette of a fish, likely a gobiid, is centered in the upper half of the image. The fish is facing right and has a rounded body, a small head, and a tail. The text 'MEERESGRUNDELN (GOBIIDAE)' is written in bold, blue, uppercase letters across the middle of the fish's body.

MEERESGRUNDELN (GOBIIDAE)

sind Bodenbewohner, einige Arten sind in der unteren Donau heimisch, gelten aber in der oberen Donau als eingewanderte, invasive Arten.

MERKMALE zwei Rückenflossen, erste Rückenflosse aus Hartstrahlen, Bauchflossen zu einer Saugscheibe verwachsen, großes Maul, Schuppen vorhanden

Flussgrundel *Neogobius fluviatilis*
KesslerGrundel *Ponticola kessleri*
Marmorgrundel *Proterorhinus semilunaris*
Nackthalsgrundel *Babka gymnotrachelus*
Schwarzmundgrundel *Neogobius melanostomus*

Art **Neogobius fluviatilis**
Name Engl. **Monkey goby**

FLUSSGRUNDEL

Max. Länge
16 cm

Familie
Meeresgrundeln (Gobiidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
mehrmals pro Jahr

Laichsubstrat
bewacht in Höhlen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art *Ponticola kessleri*
Name Engl. Bighead goby

KESSLERGRUNDEL

Max. Länge
20 cm

Familie
Meeresgrundeln (Gobiidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
mehrmals pro Jahr

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
rund

Laichsubstrat
bewacht in Höhlen

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Proterorhinus semilunaris**
Name Engl. **Tubenose goby**

MARMORGRUNDEL

Max. Länge
8 cm

Familie
Meeresgrundeln (Gobiidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
März–April

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
rund

Laichsubstrat
bewacht in Höhlen

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art **Babka gymnotrachelus**
Name Engl. **Racer goby**

NACKTHALSGRUNDEL

Max. Länge
10 cm

Familie
Meeresgrundeln (Gobiidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
mehrmals pro Jahr

Laichsubstrat
bewacht in Höhlen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Neogobius melanostomus**
Name Engl. **Round goby**

SCHWARZMUNDGRUNDEL

Max. Länge
20 cm

Familie
Meeresgrundeln (Gobiidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
mehrmals pro Jahr

Wanderdistanz
kurz

Querschnitt
rund

Laichsubstrat
bewacht in Höhlen

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

NEUNAUGEN (PETROMYZONTIDAE)

sind eigentlich gar keine Fische, aber stammesgeschichtlich nahe Verwandte. Sie laichen im Oberlauf von Bächen und Flüssen. Ihre blinden Larven (Querder) leben bis zu 7 Jahren im Sediment vergraben, bis sie fertig entwickelt sind.

MERKMALE schlangenförmige Gestalt, keine paarigen Flossen, sieben Kiemenöffnungen, nur eine Nasenöffnung

Donaubachneunauge Eudontomyzon mariae

Art *Eudontomyzon mariae*
Name Engl. Danube lamprey

DONAUBACHNEUNAUGE

Max. Länge
15 cm

Familie
Neunaugen (Petromyzontidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Detritus

Querschnitt
rund

Laichzeit
März–April

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

A light yellow silhouette of a fish, likely a quappe, is centered horizontally. The fish is facing right and has a rounded head, a dorsal fin on its back, and a tail. The text 'QUAPPEN (LOTIDAE)' is written in bold blue capital letters across the middle of the fish's body.

QUAPPEN (LOTIDAE)

gehören zu den Dorschen und sind mit einer Art auch im Süßwasser vertreten.

MERKMALE *Bauchflossen sitzen im Kehlbereich, eine Bartel am Unterkiefer*

Aalrutte Lota lota

Art **Lota lota**
Name Engl. **Burbot** **AALRUTTE**

Max. Länge
80 cm

Familie
Quappen (Lotidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen,
Fische**

Querschnitt
rund

Laichzeit
Dezember-März

Laichsubstrat
Schotter / Kies

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

sind kleine Bodenbewohner, die sich von wirbellosen Tieren ernähren.

MERKMALE manche Arten haben einen ausklappbaren Dorn in einer Hautfalte unter den Augen, 6-10 Barteln, langer, seitlich etwas zusammengedrückter Körper - winzige Schuppen

Goldsteinbeißer *Sabanjewia balcanica*
Schlammpeitzger *Misgurnus fossilis*
Steinbeißer *Cobitis elongatoides*

Art *Sabanejewia balcanica*
Name Engl. Balcan loach

GOLDSTEINBEISSER

Max. Länge
15 cm

Familie
Schmerlen (Cobitidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
Mai–Juni

Laichsubstrat
**Pflanzen / Sand /
Schotter**

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art *Misgurnus fossilis*
Name Engl. Weatherfish

SCHLAMMPETZGER

Max. Länge
30 cm

Familie
Schmerlen (Cobitidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
rund

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

Art *Cobitis elongatoides*
Name Engl. Spined loach

STEINBEISSER

Max. Länge
15 cm

Familie
Schmerlen (Cobitidae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
oval hoch

Laichzeit
Mai-Juni

Laichsubstrat
Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

STÖRE (ACIPENSERIDAE)

fressen am Gewässergrund Kleintiere, Weitstreckenwanderer, die im Meer leben und zum Laichen in die Flüsse wandern (Ausnahme: Sterlet, lebt nur im Fluss), Geschlechtsreife erst nach vielen Jahren, können sehr alt werden.

MERKMALE haiähnliche Gestalt, große nebeneinanderliegende Knochenschilder, fünfeckiger Querschnitt, ungleichmäßig geformte Schwanzflosse

Glatt Dick *Acipenser nudiiventris*

Hausen *Huso huso*

Sterlet *Acipenser ruthenus*

Sternhausen *Acipenser stellatus*

Waxdick *Acipenser gueldenstaedtii*

Art **Acipenser nudiventris**
Name Engl. **Ship sturgeon**

GLATTDICK

Max. Länge
220 cm

Familie
Störe (Acipenseridae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
vom Aussterben bedroht

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
fünfeckig

Laichzeit
April–Juni

Laichsubstrat
Fels / Schotter

Wanderdistanz
lang

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering–mittel

Art **Huso huso**
Name Engl. **Giant sturgeon**

HAUSEN

Max. Länge
800 cm

Familie
Störe (Acipenseridae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
vom Aussterben bedroht

bevorzugte Nahrung
Fische

Querschnitt
fünfeckig

Laichzeit
**Jänner-April /
August-November**

Laichsubstrat
Fels / Schotter

Wanderdistanz
lang

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering - mittel

Art **Acipenser ruthenus**
Name Engl. **Sterlet**

STERLET

Max. Länge
125 cm

Familie
Störe (Acipenseridae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
gefährdet

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
fünfeckig

Laichzeit
April–Juni

Laichsubstrat
Fels / Schotter

Wanderdistanz
mittel

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering–mittel

Art **Acipenser stellatus**
Name Engl. **Starry sturgeon**

STERNHAUSEN

Max. Länge
250 cm

Familie
Störe (Acipenseridae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
vom Aussterben bedroht

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Querschnitt
fünfeckig

Laichzeit
Mai–Juni

Laichsubstrat
Fels / Schotter

Wanderdistanz
lang

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering–mittel

Art **Acipenser gueldenstaedtii**
Name Engl. **Danube sturgeon**

WAXDICK

Max. Länge
240 cm

Familie
Störe (Acipenseridae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
vom Aussterben bedroht

bevorzugte Nahrung
**Kleinlebewesen am
Gewässergrund**

Laichzeit
April–Juni

Wanderdistanz
lang

Querschnitt
fünfeckig

Laichsubstrat
Fels / Schotter

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering–mittel

WELSE (SILURIDAE)

sind die größten reinen Süßwasserfische in Europa und mit einer Art in der Donau vertreten, leben räuberisch und sind nacht- und dämmerungsaktiv.

MERKMALE größer, breiter Kopf, schuppenlose Haut, lange Afterflosse, 6 Barteln, davon 2 sehr lang

Wels *Silurus glanis*

Art **Silurus glanis** **WELS**
Name Engl. **Wels catfish**

Max. Länge
300 cm

Familie
Welse (Siluridae)

Gefährungsstatus IUCN 1/2019
nicht gefährdet

bevorzugte Nahrung
Fische

Querschnitt
rund

Laichzeit
Juni–August

Laichsubstrat
Nest in Pflanzen

Wanderdistanz
kurz

bevorzugte
Strömungsgeschwindigkeit
gering

FISCHFAMILIEN - FARBCODES

AALE (Anguillidae)

BACHSCHMERLEN (Nemacheilidae)

BARSCHE (Percidae)

HECHTE (Esocidae)

HUNDSFISCHE (Umbridae)

KARPFENFISCHE (Cyprinidae)

KOPPEN (Cottidae)

LACHSFISCHE (Salmonidae)

MEERESGRUNDELN (Gobiidae)

NEUNAUGEN (Petromyzontidae)

QUAPPEN (Lotidae)

SCHMERLEN (Cobitidae)

STÖRE (Acipenseridae)

WELSE (Siluridae)

Projektkoordination & Veröffentlichung: Hélène Masliah-Gilkarov (ICPDR)
Expertin Öffentlichkeitsarbeit: Susanne Brandstetter (BMLRT)
Projektleitung: Franz Wagner (BMLRT) & Igor Liška (ICPDR)
Wissenschaftliche Beratung, Fisch: Vinzenz Bammer, Wolfgang Hauer (BAW)
Wissenschaftliche Beratung, Makrophyten: Karin Pall (systema)
Bildbearbeitung: NIC Werbeagentur Gmbh
Layout/Design: Tobias Held **Illustration:** Tobias Held, BüroX
Fischfotografie: ©Wolfgang Hauer **Druck:** hs Druck GmbH

Bundesministerium
Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus

Bundesamt
für Wasserwirtschaft

Herausgeber: IKSD
Internationale Kommission
zum Schutz der Donau

Email: secretariat@icpdr.org
©Text ICPDR 2020,
www.icpdr.org